




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.eopyy.gov.gr

Αθήνα, 2-7-2025

Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/Γ99/11532

**Γενική Δ/νση: Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς
Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση: Φαρμάκου
Τμήμα: Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης
Φαρμάκων**

Πληροφορίες: Α. Πασχάλη
Τηλ.: 210 8110575, 655 Fax: 210 8110544
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι
E-mail: d6.t1@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:

✓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Ε.Α.Κ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΗΔΙΚΑ

a.staridas@idika.gr

s.boutas@idika.gr

Θέμα: «Σχετικά με συνταγογράφηση αυτοεπιμέρους αδρεναλίνης από αλλεργιολόγους».

Σχέτ. 1. Η από 15-05-2025 Επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Ε.Ε.Α.Κ.Α

2. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΔΒ4Α/Γ99/οικ. 9197 12-3-2019 έγγραφο του Οργανισμού μας με θέμα «Οδηγίες για τη συνταγογράφηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων EPINEPHRINE».

Όσον αφορά στο φάρμακο JEXT και στην επιστολή σας αναφορικά με τη συνταγογράφηση του, διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ.12 παρ. 1α του ν.3816/2010: «*Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης εγκρίνουν και εξοφλούν ιατρικές συνταγές μόνο εφόσον αυτές περιλαμβάνουν φάρμακα που περιέχονται σε κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και μόνο για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, όπως αυτές καθορίζονται στην περίληψη χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού προϊόντος*».

Στην εγκεκριμένη άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου αναγράφεται:

«Παιδιατρικός πληθυσμός:

Ασθενείς βάρους μεταξύ 15 kg και 30 kg: Η συνήθης δόση είναι 150 μικρογραμμάρια. Μια δόση κάτω των 150 μικρογραμμάτων δεν μπορεί να χορηγηθεί με επαρκή ακρίβεια σε παιδιά που ζυγίζουν λιγότερο από 15 kg και επομένως η χρήση της δεν συνιστάται εκτός εάν υπάρχει απειλητική για τη ζωή κατάσταση και κατόπιν ιατρικής συμβουλής. Στα παιδιά και τους εφήβους βάρους άνω των 30 kg θα πρέπει να συνταγογραφείται Jext 300 μικρογραμμάρια.

Χρήση σε ενήλικες άνω των 30 kg:

Η συνήθης δόση είναι 300 μικρογραμμάρια. Σε μεγαλύτερους ενήλικες μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία ενέσεις για να αντιστραφεί η επίδραση μιας αλλεργικής αντίδρασης.

Σε ασθενείς βάρους μεταξύ 15 kg και 30 kg θα πρέπει να συνταγογραφείται Jext 150 μικρογραμμάτων.

Μια αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται αμέσως μόλις αναγνωριστούν συμπτώματα αναφυλαξίας.

Η αποτελεσματική δόση κυμαίνεται συνήθως στην περιοχή των 0,005-0,01 mg/kg, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν υψηλότερες δόσεις.

Εάν δεν παρατηρηθεί κλινική βελτίωση ή εάν παρουσιαστεί επιδείνωση, μπορεί να χορηγηθεί μια δεύτερη ένεση με ένα επιπλέον Jext 5-15 λεπτά μετά την πρώτη ένεση. Συνιστάται να συνταγογραφούνται στους ασθενείς δύο πένες Jext, τις οποίες θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους».

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η ποσότητα του φαρμάκου JEXT καθορίζεται με βάση την ηλικία και το βάρος του ασθενούς και ανάλογα την περίπτωση δύναται να δικαιολογηθεί η συνταγογράφηση στην ίδια συνταγή δύο σκευασμάτων JEXT (300 ή 150)mcg.



**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

Π. ΛΙΤΣΑ

Εσωτερική Διανομή

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ dioikitis@eopyy.gov.gr

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
gmanager2@eopyy.gov.gr